

「賽安勃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 11 月 13 日農授防字第 1141878655B 號公告修正

10.26(%) (w/w) 賽安勃 水分散性油懸劑 (OD)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
十字花 科包葉 菜類	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		7		
番茄	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
甜椒	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
辣椒	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
茄子	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
枸杞	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
香瓜茄	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
樹番茄	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
瓜菜類	粉蝨類	0.625 公升	800	平均每葉 成蟲數達 1 隻以上 1 週後開 始施藥。	7	連續 2 次	藥液量 500 公升 /公頃， 藥劑量 0.625 公 升/公 頃。	4	避免於開花 期使用。	
大豆	粉蝨類	0.625	800	害蟲發生	7	共 2		3	適用於毛	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。		次			豆。	
大豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於毛 豆。	
花豆	粉蟲類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
花豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
樹豆	粉蟲類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
樹豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
豌豆	粉蟲類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
豌豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
菜豆	粉蟲類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
菜豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
菜豆	粉蟲類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
菜豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
蠶豆	粉蟲類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
蠶豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
扁豆	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
扁豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
翼豆	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
翼豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
刀豆	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
刀豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
豇豆	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
豇豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
瓜果類	粉蝨類	0.625 公升	800	平均每葉 成蟲數達 1 隻以上 1 週後開 始施藥。	7	連續 2 次	藥液量 500 公升 /公頃， 藥劑量 0.625 公 升/公 頃。	4	避免於開花 期使用。	

10.2(%) (w/w) 賽安勃 濃懸乳劑 (SE)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	小菜蛾	0.33 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				7		
荔枝	荔枝細蛾	0.5 公升	3,000	花落後 10-20 天開始施藥。	15	共 2 次		14		
檬果	螟蛾類	0.5 公升	3,000	新梢抽出後開始施藥。	15	連續 2 次		21	避免於開花期使用影響授粉昆蟲。	
山茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。						
山茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。						
茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	
茶	捲葉蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	
茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	
十字花科包葉菜類	小菜蛾	0.33 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				7		

18.41(%) (w/w) 賽安勃 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
番茄、 甜椒、 茄子、 辣椒、 枸杞、 香瓜 茄、 樹番茄	粉蝨類	0.5 公 升	2,000	植株移植 後 7 天， 每株灌注 藥液 50 毫升 1 次。					限苗期使 用，依使用 方法用藥， 不須訂定安 全採收期。	本 項 新 增。原始 登 記 廠 商名稱： 台 灣 富 美 實 有 限公司。