


NING WARNING WARNING

## 強勢外來入侵植物


WARNING WARNING WARNING

WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING



強勢外來入侵植物 防除系列

# 香澤蘭



農業部  
林業及自然保育署

Forestry and Nature Conservation Agency,  
Ministry of Agriculture



WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING

# 香澤蘭

香澤蘭原產熱帶美洲，在亞洲各國廣泛歸化，為侵略性強之雜草。菊科香澤蘭屬，多年生草本植物，株高可達2公尺；莖直立偶為攀緣性，多分枝，小枝成直角分生，全株密被白色絨毛；單葉，對生偶互生或輪生，三角狀卵形，長3-8公分，寬2-6公分，先端銳尖，基部楔形，粗鋸齒緣，3出脈，柄長1-2公分；多數頭狀花序排成繖房花序，頂生；不具舌狀花；管狀花白紫色，花冠圓柱形，5裂；瘦果黑色，圓柱狀，5稜，具白色冠毛。



## 防治方法

香澤蘭以人工防除為主，為預防產生大量種子傳播，**最佳防治時間為10-11月開花前連根移除**，以減少族群開花結實數量，且橫走根狀莖亦需拔起清除，減少生長新根與新植株之無性繁殖。

## 危害情況

香澤蘭的繁殖方式包含橫走的根狀莖和隨風飄揚的種子，常見於南部海拔1000公尺以下的林地、林緣、林內曠地、荒地、田埂、河床及荒廢農田，取代原生植物，霸占棲地而導致豐富多樣性之植物相逐漸消失。

