



主旨：中部地區連續降雨及局部豪雨，重要經濟作物病害風險升高，籲請農友加強防範疫病及軟腐病。臺中改良場、防檢署及田邊好幫手關心您。

親愛的會員您好

這是來自農業部-田邊好幫手的 植物疫情 通知

主旨：中部地區連續降雨及局部豪雨，重要經濟作物病害風險升高，籲請農友加強防範疫病及軟腐病。臺中改良場、防檢署及田邊好幫手關心您。

發布日期：2026/06/12

發布單位：農業部臺中區農業改良場

直物品項：蔬菜、水果、花卉

發布縣市：台中市、彰化縣、南投縣

疫情內容：

一、近日受滯留鋒面及西南氣流影響，中部地區出現連續降雨及局部豪雨，長時間降雨易造成田間積水及環境溼度升高，有利疫病及細菌性軟腐病等病害發生與蔓延，請及早採取預防措施，降低作物受害風險。

二、疫病及細菌性軟腐病為豪雨過後常見作物病害。疫病菌屬卵菌類，在高溼環境下可迅速產生大量孢囊及游走孢子，並藉由雨水飛濺或灌溉水傳播擴散。中部地區果樹（如木瓜、芒果及百香果）、蔬菜（如苦瓜與絲瓜）及花卉（如文心蘭）等重要經濟作物之根、莖、葉、花及果實等部位均可能受到疫病危害。發病初期常出現水浸狀病斑，隨後逐漸轉為褐色壞疽斑，造成組織腐敗與枯萎；當環境相對溼度較高時，病斑表面常可見白色黴狀菌絲，成為田間二次感染來源。

三、除了疫病外，細菌性軟腐病也需格外注意，其病原細菌可經由植體傷口或自然開口侵入，在高溫高溼環境下迅速繁殖，短時間內即可能造成組織軟化、水浸狀腐敗及產生明顯惡臭等症狀。特別是在蔬菜類與花卉作物，若田區通風不良或排水不佳，更容易造成病情快速擴散。

建議用藥：

一、加強田間排水管理，避免積水超過24小時。

二、適度修剪作物枝葉及疏除過密植株，提升通風及日照條件。設施栽培花卉應適時開啟通風設備，降低相對溼度。

三、雨後儘速巡園，發現罹病枝葉、果實或植株應立即移除並帶離田區，減少感染源。

四、避免於葉面潮溼時進行修剪、整枝等田間作業，以降低病原傳播風險。

五、掌握雨前及降雨間歇期用藥，選擇核准登記藥劑，可參考防檢署農藥資訊服務網（<https://pesticide.aphis.gov.tw/information/>），輪流使用不同作用機制的藥劑，以降低抗藥性，並遵守各藥劑之安全採收期。

農業部版權所有 Copyright © 2023 All Rights Reserved

100212 臺北市中正區南海路37號 電話：(02)2381-

3991 傳真：(02)2312-5878

服務時間：AM8:30 - PM5:30 網址：

<https://m.moa.gov.tw>