

「依普同」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 8 月 20 日農授防字第 1151877770A 號公告修正

一、變更安全劑型一覽表

農藥名稱	登記廠商名稱	變更日期	備註
500g/L(50% w/v)依普同 水懸劑	洽益化學股份有限公司	115 年 8 月 20 日	本藥劑係 50%依普同可溼性粉劑轉換為更安全劑型

二、「依普同」農藥使用方法與範圍一覽表

23.7(%) (w/w) 依普同 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茄科小葉菜類	灰黴病	0.5-1.5 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
蔥科小葉菜類	紫斑病	1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	10	4		6		
蔥	紫斑病	1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	10	4		15		
韭	紫斑病	1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	10	4		15		
茭白筍	胡麻葉枯病	1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	2		6		
茄科根菜類	灰黴病	0.5-1.5 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			15		
蔥科根菜類	紫斑病	1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	10	4		6		
洋蔥	紫斑病	1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	10	4		15		
番茄、甜椒、	灰黴病	0.5-1.5 公升	1,000	病害發生初期開始	7			6		本項修正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
辣椒、 茄子、 枸杞、 香瓜 茄、 野茄、 酸漿、 樹番茄				施藥。						
番茄	灰黴病	1 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	2		6		
木瓜	蒂腐病		1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	6		21		
草莓	灰黴病	1-1.2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		3		
葡萄	晚腐病	1-2 公 升	800	開花初期 施藥。	7			12	施藥至套袋 前為止。	
楊桃	炭疽病	1-2 公 升	800	開花初期 施藥。	7			12	施藥至套袋 前為止。	
蓮霧	炭疽病	1.3-3.8 公升	800	開花初期 施藥。	7			12	施藥至套袋 前為止。	
番石榴	炭疽病	1.5-2.5 公升	800	開花初期 施藥。	7			12	施藥至套袋 前為止。	
無花果	炭疽病	1-2 公 升	800	小果期施 藥。	7			12		
檬果	炭疽病		800	開花初期 施藥。	7	4		12	開花初期開 始施藥，以 後每隔 7 天 施藥 1 次， 連續 4 次。 結果以後每 隔 14 天施 藥 1 次，至 套袋為止。	
梨	黑斑病		1,000	病害發生	7-10	5		6		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				初期開始 施藥。						
梨	炭疽病	1.3-2.5 公升	800	開花初期 施藥。	7			6		
蘋果	炭疽病	1.1-1.5 公升	800	開花初期 施藥。	7			12		
桃	炭疽病	1.3-2.5 公升	800	開花初期 施藥。	7			12		
梅	炭疽病	1.5-2.3 公升	800	開花初期 施藥。	7			12		
枇杷	炭疽病	1.9-2.5 公升	800	開花初期 施藥。	7			12		
柿	炭疽病	1.3-1.9 公升	800	開花初期 施藥。	7			12		

50(%) (w/w) 依普同 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
高粱	穗腐病	1 公克/ 公斤種子		拌種時施 藥。			藥先均 勻溶於 10 公撮 蒸餾水 中，再 和 1 公 斤種子 充分混 合。		經過處理的 種子要儲藏 在攝氏 4- 10 度之冷 藏庫中，以 免降低發芽 率及活力。	本 項 修 正。
薏苡	葉枯病	1.2 公 斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		21		
落花生	冠腐病	每公斤 種子施 0.5 公 克					播種前 剝殼拌 種。		限拌種使 用。	本 項 修 正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
茄科小 葉菜類	灰黴病	0.3-0.8 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
蔥科小 葉菜類	紫斑病	0.8-1.0 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	4-5		6		
蔥	紫斑病	0.8-1.0 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	4-5		6	本藥劑試驗 時加展著劑 「組展」 5,000 倍。	
韭	紫斑病	0.8-1.0 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	4-5		6	本藥劑試驗 時加展著劑 「組展」 5,000 倍。	
茄科根 菜類	灰黴病	0.3-0.8 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		
蔥科根 菜類	紫斑病	0.8-1.0 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	4-5		6		
洋蔥	紫斑病	0.8-1.0 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	4-5		6	本藥劑試驗 時加展著劑 「組展」 5,000 倍。	
<u>番茄、</u> <u>甜椒、</u> <u>辣椒、</u> <u>茄子、</u> <u>枸杞、</u> <u>香瓜</u> <u>茄、</u> <u>野茄、</u> <u>酸漿、</u> <u>樹番茄</u>	灰黴病	0.3-0.8 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		本 項 修 正。
草莓	灰黴病	0.8-1 公 斤	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			4	本試驗添加 展著劑「全 透力」	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									1,000 倍。	
梨	黑斑病	2.5 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥。	10	5-6		9	加展著劑「全透力」3,000 倍。	
百慕達草	黃葉病	1 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥。	10	3				

500g/L(50%w/v) 依普同 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
高粱	穗腐病	1 毫升/公斤種子		拌種時施藥。			藥先均勻溶於 10 公撮蒸餾水中，再和 1 公斤種子充分混合。		經過處理的種子要儲藏在攝氏 4-10 度之冷藏庫中，以免降低發芽率及活力。	變更安全劑型
薏苡	葉枯病	1.2 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		21		
落花生	冠腐病	每公斤種子施 0.5 毫升					播種前剝殼拌種。		限拌種使用。	
茄科小葉菜類	灰黴病	0.3-0.8 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
蔥科小葉菜類	紫斑病	0.8-1.0 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	10	4-5		6		
蔥	紫斑病	0.8-1.0 公升	1,000	病害發生初期開始	10	4-5		6	本藥劑試驗時加展著劑	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。					「組展」 5,000 倍。	
韭	紫斑病	0.8-1.0 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	4-5		6	本藥劑試驗 時加展著劑 「組展」 5,000 倍。	
茄科根 菜類	灰黴病	0.3-0.8 公升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		
蔥科根 菜類	紫斑病	0.8-1.0 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	4-5		6		
洋蔥	紫斑病	0.8-1.0 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	4-5		6	本藥劑試驗 時加展著劑 「組展」 5,000 倍。	
<u>番茄、</u> <u>甜椒、</u> <u>辣椒、</u> <u>茄子、</u> <u>枸杞、</u> <u>香瓜</u> <u>茄、</u> <u>野茄、</u> <u>酸漿、</u> <u>樹番茄</u>	灰黴病	0.3-0.8 公升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
草莓	灰黴病	0.8-1 公 升	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			4	本試驗添加 展著劑「全 透力」 1,000 倍。	
梨	黑斑病	2.5 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	5-6		9	加展著劑 「全透力」 3,000 倍。	
百慕達 草	黃葉病	1 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	3				