農業部臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 115 年 10 月 28 日

中部地區水稻飛蝨類及瘤野螟害蟲發生，臺中農改場籲請稻農加強管理以降低危害

中部地區水稻已陸續進入乳熟至糊熟期，近期薔琵颱風過後調查發現，特定稻叢生長旺盛，田區有白背飛蝨與褐飛蝨之成蟲及若蟲聚集危害；部分田區亦有瘤野螟幼蟲捲葉危害，臺中區農業改良場籲請中部地區稻農注意此二類害蟲並加強防治，以確保產量與品質。

臺中農改場表示，白背飛蝨與褐飛蝨之成、若蟲偏好成群聚集水稻基部及中段，吸取稻液產生危害，受害輕者基葉黃化，危害重者則全株枯萎、倒伏，造成「蝨燒」現象。農友可檢視稻叢基部，若發現每叢水稻之飛蝨數量達 5 隻時，應立即進行防治作業。瘤野螟幼蟲則會將水稻葉片縱捲成苞，隱匿其中取食危害，影響葉片光合作用，進而降低水稻產量；建議農民於田間發現每平方公尺超過 1 隻成蛾後，於 7 天內施藥防治，可得到最佳防治效果。

臺中農改場進一步指出，農民可選用農藥資訊服務網 (https://pesticide.aphia.gov.tw/information/Query/Bug) 推薦藥劑進行防治，飛蝨類可選用包括：10% 氟美派水懸劑 2,400 倍 (避免開花期使用)、10% 賽速安水溶性粒劑 4,000 倍、16% 可尼丁水溶性粒劑 3,000 倍、25% 派滅淨可濕性粉劑 1,500 倍或 20% 達特南水溶性粒劑 3,000 倍等，建議施藥前可將稻田水位提高，將蟲體往上趕而增加與藥劑接觸機會，施藥時藥液儘量噴至全株至稻叢基部位置。瘤野螟防治藥劑則可選用：360g/L 滅芬諾特水懸劑 3,200 倍與賽洛寧乳劑 2,000 倍等。該場最後提醒農民加強飛蝨類與瘤野螟的防治，同時施用已核准之登記藥劑，並遵守每公頃施藥量及其稀釋倍數。

聯絡人：農業部臺中區農業改良場 賴欣怡助理研究員
電　話：(04)8523101 轉 421
e-mail：albizzia@tcdares.gov.tw

撰稿人：農業部臺中區農業改良場 郭建志副研究員
電　話：(04)8523101 轉 330
e-mail：kuocc@tcdares.gov.tw